

Paciente : EVA FLORENTIN
Idade: 50ano(s)
Médico: 2895 - ROGERIO R. CISNEROS
Convenio: CASSEMS

Cpf: 813.155.541-00
Rg: 563433
Atendimento: 0053534
Data: 10/09/2019
Origem: MS DIAGNÓSTICOS

Ultrassonografia do punho direito

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, banda larga, na frequência de 7,5 a 12 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculos: com espessuras normais e texturas homogêneas.

Punho face dorsal

- 1º compartimento; (T. abdutor longo e extensor curto do polegar): íntegros.
- 2º compartimento; (T. extensores longo e curto do carpo): íntegros.
- 3º compartimento; (T. extensor longo do polegar): íntegro.
- 4º compartimento; (T. extensores dos dedos e do indicador): íntegros.
- 5º compartimento; (T. extensor do 5º dedo): íntegro.
- 6º compartimento; (T. extensor ulnar do carpo): íntegro.

Punho face ventral: Nota-se em tendão flexor ulnar do carpo espessado e hipoecoico.

Nervo mediano: com espessura conservada.

Retináculo dos flexores: sem alterações.

Hipótese diagnóstica:

- Tendinopatia do tendão flexor ulnar do carpo.



Dr. Vander Caetano Vieira
Radiologia e Diagnósticos por imagem
CRM/3434 RQE 4760

Paciente : EVA FLORENTIN
Idade: 50ano(s)
Médico: 2895 - ROGERIO R. CISNEROS
Convenio: CASSEMS

Cpf: 813.155.541-00
Rg: 563433
Atendimento: 0053534
Data: 10/09/2019
Origem: MS DIAGNÓSTICOS

Ultrassonografia do punho esquerdo

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, banda larga, na frequência de 7,5 a 12 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculos: com espessuras normais e texturas homogêneas.

Punho face dorsal

- 1º compartimento; (T. abductor longo e extensor curto do polegar): íntegros.
- 2º compartimento; (T. extensores longo e curto do carpo): íntegros.
- 3º compartimento; (T. extensor longo do polegar): íntegro.
- 4º compartimento; (T. extensores dos dedos e do indicador): íntegros.
- 5º compartimento; (T. extensor do 5º dedo): íntegro.
- 6º compartimento; (T. extensor ulnar do carpo): íntegro.

Nota-se imagem cística, anecoica, na face dorsal do punho medindo 1,2 cm.

Punho face ventral: Nota-se em tendão flexor ulnar do carpo espessado e hipoecoico.

Nervo mediano: com espessura conservada.

Retináculo dos flexores: sem alterações.

Hipótese diagnóstica:

- Tendinopatia do tendão flexor ulnar do carpo.
- Cisto sinovial.



Dr. Vander Caetano Vieira
Radiologia e Diagnósticos por imagem
CRM/3434 RQE 4760

Paciente : EVA FLORENTIN
Idade: 50ano(s)
Médico: 2895 - ROGERIO R. CISNEROS
Convenio: CASSEMS

Cpf: 813.155.541-00
Rg: 563433
Atendimento: 0053534
Data: 10/09/2019
Origem: MS DIAGNÓSTICOS

Ultrassonografia do cotovelo esquerdo

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, banda larga, na frequência de 7,5 a 12 MHz, com varredura linear.

Tendões epicondilianos laterais espessados e hipoeoicos.

Tendões epicondilianos mediais de calibre, contornos e textura habituais.

Superfície óssea epicondileana lateral: irregular.

Musculatura do antebraço: de aspecto anatômico.




Cavidade articular: sem sinais de derrame.

Bursa do olécrano: preservada.

Hipótese diagnóstica:
Epicondilite lateral.




Dr. Vander Caetano Vieira
Radiologia e Diagnósticos por imagem
CRM/3434 RQE 4760



10/09/2019
9:06:49 AM



10/09/2019
9:07:38 AM



10/09/2019
9:08:09 AM

