

Nome: MAURA REGINA AYALA
 ID: 30052969
 Data Nascimento: 29/12/1968
 Médico Solicitante: THIAGO NOGUEIRA SANTOS NA: 70998652

01/12/2021 21:37

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO ESQUERDO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares ponderadas em T1, STIR e densidade protônica com supressão de gordura, antes e após a administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Alterações pós-cirúrgicas no tendão calcâneo, numa extensão aproximada de 6,8 cm, caracterizadas por área de alteração de sinal heterogênea, com artefatos de susceptibilidade adjacentes.

Reação osteohipertrófica na talonavicular dorsal, associado a espessamento capsuloligamentar, redução do espaço articular e esclerose subcondral no navicular.

Entesófito na inserção distal do tendão calcâneo.

Espessamento e alteração de sinal intrassubstancial da porção central da aponeneurose plantar com obliteração/edema do coxim gorduroso adjacente, achados que podem estar relacionados a fascite, na dependência de correlação com dados clínicos. Associa-se entesófito plantar no calcâneo.

Demais estruturas ósseas com morfologia e intensidade de sinal preservados.

Ligamento de Lisfranc íntegro.

Afilamento dos ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular, com fibrose circunjacente, possivelmente relacionada a injúria crônica.

Demais ligamentos laterais e do complexo ligamentar deltoide do tornozelo íntegros.

Túnel e seio do tarso sem alterações.

Não há diástase significativa da sindesmose tibiofibular.

Não há evidências de lesões osteocondrais no domus talar ou derrame articular significativo.

Tendinopatia do tibial posterior caracterizada por leve espessamento e alteração de sinal.

Tendinopatia dos fibulares, notadamente na porção inframaleolar.

Demais estruturas musculotendíneas com morfologia e intensidade de sinal normais.

Feixes neurovasculares sem alterações ao método.

Edema da tela subcutânea perimaleolar medial.

Edema da gordura de Kager.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Alterações pós-cirúrgicas no tendão calcâneo, caracterizadas por área de alteração de sinal heterogênea, com artefatos de susceptibilidade adjacentes.

Sinais sugestivos de fascite plantar.

Afilamento dos ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular, com fibrose circunjacente, possivelmente relacionada a injúria crônica.

Tendinopatia do tibial posterior e dos fibulares.





cerdil
DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS

PET CT - CINTILOGRAFIA / MEDICINA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ALTO CAMPO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE 128 E 64 CANAIS
RADIOLOGIA DIGITAL - MAMOGRAFIA DIGITAL DR
ULTRASSONOGRAFIA 4D / DOPPLER GERAL E VASCULAR
DENSITOMETRIA ÓSSEA - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

J. Lenza

DraJanine Guimarães Lenza Maruzzi

CRM/SP 137348

"Gracas a Deus, que nos dê
a Vitória por intermédio de
nossa Senhor Jesus Cristo"
1 Coríntios 15:57

ACESSE SEU EXAME:

www.cerdil.com.br



(67) 99604-6670



(67) 3420-5900



[cerdildiagnosticos](#)

Campo Grande

Naviraí

Corumbá

Ponta Porã

Dourados



Nome: MAURA REGINA AYALA
ID: 30052969
Data Nascimento: 29/12/1968
Médico Solicitante: THIAGO NOGUEIRA SANTOS

Sexo: F
Data Exame: 25/11/2021
Nº: 70998651

01/12/2021 21:37

RESONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO DIREITO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares ponderadas em T1, STIR e densidade protônica com supressão de gordura, antes e após a administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Alterações pós-cirúrgicas no tendão calcâneo, numa extensão aproximada de 7,0 cm, caracterizadas por área de alteração de sinal heterogênea, com artefatos de susceptibilidade adjacentes.

Reação osteohipertrófica na talonavicular dorsal, associado a espessamento capsuloligamentar.

Entesófito na inserção distal do tendão calcâneo.

Espessamento e alteração de sinal intrassubstancial da porção central da aponeneurose plantar com obliteração/edema do coxim gorduroso adjacente, achados que podem estar relacionados a fasciite, na dependência de correlação com dados clínicos. Associa-se entesófito plantar no calcâneo.

Demais estruturas ósseas com morfologia e intensidade de sinal preservados.

Ligamento de Lisfranc íntegro.

Afilamento dos ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular, com fibrose circunjacente, possivelmente relacionada a injúria crônica.

Demais ligamentos laterais e do complexo ligamentar deltoide do tornozelo íntegros.

Túnel e seio do tarso sem alterações.

Não há diástase significativa da sindesmose tibiofibular.

Não há evidências de lesões osteocondrais no domus talar ou derrame articular significativo.

Tendinopatia do tibial posterior caracterizada por leve espessamento e alteração de sinal, com pequena distensão líquida de sua bainha sinovial, inferindo sinovite.

Demais estruturas musculotendíneas com morfologia e intensidade de sinal normais.

Feixes neurovasculares sem alterações ao método.

Edema da tela subcutânea perimaleolar medial.

Edema da gordura de Kager.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Alterações pós-cirúrgicas no tendão calcâneo, caracterizadas por área de alteração de sinal heterogênea, com artefatos de susceptibilidade adjacentes.

Sinais sugestivos de fascite plantar.

Afilamento dos ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular, com fibrose circunjacente, possivelmente relacionada a injúria crônica.

Tendinopatia do tibial posterior.



cerdil
DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS

PET CT - CINTILOGRAFIA / MEDICINA NUCLEAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ALTO CAMPO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE 128 E 64 CANAIS
RADIOLOGIA DIGITAL - MAMOGRAFIA DIGITAL DR
ULTRASSONOGRAFIA 4D / DOPPLER GERAL E VASCULAR
DENSITOMETRIA ÓSSEA - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Dra.Janine Guimarães Lenza Maruzzi

CRM/SP 137348

"Gracas a Deus, que nos dà
a Vitória por intermédio do
nossa Senhor Jesus Cristo"
1 Coríntios 15:57

ACESSE SEU EXAME: www.cerdil.com.br



(67) 99604-6670



(67) 3420-5900



cerdildiagnosticos

📍 Campo Grande

📍 Corumbá

📍 Dourados

📍 Naviraí

📍 Ponta Porã