



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prontuário: _____

Nome: ROSALINA PEREIRA LEMES

End.: _____ Nº _____ Bairro: _____

LAUDO

PACIENTE PORTADORA DE LOMBOCIATALGIA CRONICA AGUDIZADA COM
PARESTESIA DOS MEMBROS INFERIORES
RNM DE COLUNA LOMBAR: ESPONDILOARTROSE L5-S1 COM
HERNIAÇÃO DISCAL E ESTENOSE DOS FORAMES DE CONJUGAÇÃO.
DOR REFRATARIA AO TRATAMENTO CONSERVADOR.
INCAPACITADA PARA ATIVIDADE LABORAL POR TEMPO INDETERMINADO

M54.3

M51.1

28/11/22


Franserg Sacomam
Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia Ombro e Cotovelo
CRM 10487/MS Teot 16292
CNES 707303015919570

FRANSERG SACOMAM
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
CRM/MS 10487 TEOT 16292

Paciente: ROSALINA PEREIRA LEMOS,
Solicitante: FRANSERG SACOMAN
Atendimento: 027 - 0287933 **Nasc:** 28/04/1971
Data: 27/10/2022

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

TÉCNICA: Obtidas imagens em aparelho de alto campo, com aquisições multiplanares em diferentes ponderações, sem a administração endovenosa do produto de contraste paramagnético.

OS SEGUINTE ASPECTOS FORAM OBSERVADOS:

O canal vertebral é de dimensões normais por toda a extensão avaliada.

Os corpos vertebrais lombares apresentam altura e alinhamento posterior preservados.

Formações osteofitárias anterolaterais nos corpos vertebrais lombares.

Hipossinal dos discos intervertebrais lombares, quando o contraste se baseia em T2, inferindo desidratação dos mesmos.

Alterações degenerativas discogênicas tipo II de Modic (gordura) nos platôs vertebrais contíguos de L5-S1, com redução da altura do espaço intervertebral neste nível.

Abaulamentos discais difusos em L3-L4 e L4-L5, que determinam discreta impressão na face ventral do saco dural e se estendem para a base dos forames de conjugação adjacentes, reduzindo levemente a amplitude dos mesmos, sem conflitos radiculares aparentes.

Complexo disco-osteofitário posterior em L5-S1, que comprime a face ventral do saco dural e se estende para os forames de conjugação adjacentes, determinando moderada estenose dos mesmos, onde estabelece contato com as raízes nervosas emergentes de L5 bilateralmente.

Hipertrofia facetária bilateral em L4-L5 e L5-S1.

O cone medular encontra-se ao nível do interespaço T12-L1, sendo de morfologia e intensidade de sinal normais.

Raízes nervosas da cauda eqüina com morfologia e distribuição anatômicas.

Paciente: ROSALINA PEREIRA LEMOS,
Solicitante: FRANSERG SACOMAN
Atendimento: 027 - 0287933 **Nasc:** 28/04/1971
Data: 27/10/2022

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA: Avaliação por ressonância magnética da coluna lombossacra evidencia como principais achados:

Espondilose lombar.

Desidratação discal difusa, com redução da altura do espaço intervertebral L5-S1.

Hipertrofia facetária bilateral em L4-L5 e L5-S1.

Abaulamentos discais difusos em L3-L4 e L4-L5, que determinam discreta impressão na face ventral do saco dural e se estendem para a base dos forames de conjugação adjacentes, reduzindo levemente a amplitude dos mesmos, sem conflitos radiculares aparentes.

Complexo disco-osteofitário posterior em L5-S1, que comprime a face ventral do saco dural e se estende para os forames de conjugação adjacentes, determinando moderada estenose dos mesmos, onde estabelece contato com as raízes nervosas emergentes de L5 bilateralmente.

Laudado por: ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO e Assinado por: CRM-MS:6862 - ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO


DR. ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO
CRM-MS 6862 / RQE 5811



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo