

Nome: Sr(a). NEOCIR FRANCISO DE ARAUJO SILVA
A pedido do(a) Dr(a).: LUCAS FAGUNDES
Data: 11/03/2022
Atend.: 022 - 0111202/10458674
Nasc: 23/07/1971
Laudado por: EDUARDO DA SILVA BON e Assinado por: CRM-MS:8880 - EDUARDO DA SILVA BON

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 916.828.511-68

Senha NFDAS7213:


DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM-MS-8880/RQE 4943



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome: **Sr(a). NEOCIR FRANCISO DE ARAUJO SILVA**
A pedido do(a) Dr(a).: **LUCAS FAGUNDES**
Data: **11/03/2022**
Atend.: **022 - 0111202/10458674**
Nasc: **23/07/1971**

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br
Protocolo: 916.828.511-68 Senha NFDAS7213:

ESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO

TÉCNICA:

Obtidas imagens em aparelho de alto campo, com aquisições multiplanares em diferentes ponderações, sem a administração endovenosa do produto de contraste paramagnético.

OS SEGUINTE ASPECTOS FORAM OBSERVADOS:

Importante alterações degenerativas acometendo a articulação glenoumeral caracterizadas por redução do espaço articular, osteófitos marginais na cabeça umeral e na glenoide, bem como a formação de cistos subcondrais na glenoide; Nota-se, perda da esfericidade da cabeça umeral como leve subluxação cranial do mesmo que associado aos osteófitos, determinam importante redução do canal do trajeto do supra-espinhoso contra a articulação acrômio-clavicular.

Acentuada hipotrofia e lipossustituição da musculatura do supra-espinhoso com redução da espessura das suas fibras tendíneas mais anteriores e insercionais na cabeça umeral, sugerindo rotura destas fibras. Há, também sinais de hipotrofia e lipossustituição da musculatura do subescapular e do deltoide.

Focos com sinal isointenso de permeio as fibras do tendão subescapular associado a edema líquido sugerindo também tendinopatia

Pequeno derrame articular glenoumeral.

Irregularidade do labro glenoide superior sugerindo lesão.

Articulação acromioclavicular apresentando pequeno derrame articular.

IMPRESSÃO:

- Importante alterações degenerativas glenoumeral.
- Tendinose do supra-espinhoso com afilamento tendíneo.
- Tendinose do subescapular.
- Pequeno derrame articular glenoumeral.

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
PAM – POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA



Paciente **NEOCIR FRANCISCO DE ARAUJO SILVA**

Médico Solicitante Dr.(a) **ALVARO AFONSO O. SOUTO**

Data do Exame **15/06/2022**

Laudu 45912

RADIOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO

Artrose severa da articulação glenoumeral esquerda.

Comparar com exames anteriores.

Dr. Eduardo Dutra
CRM-MS 1428



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Dourados
Secretaria de Saúde